



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

คำแนะนำในการดูแลรักษาเบื้องต้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้วัคซีนโควิด นอกสถานพยาบาล

พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ

กรมการแพทย์

30 มีนาคม 2564



การจัดบริการให้วัคซีน โควิด -19 นอกสถานพยาบาล

- กรณีที่มีผู้รับวัคซีนจำนวนมาก หรือ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้วัคซีน เพื่อ ครอบคลุมประชาชนให้มากขึ้น
- ทั้งนี้ การให้บริการวัคซีนนอกสถานที่จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และความรวดเร็ว ในการนำส่งผู้ป่วย หาก เกิด กรณี ฉุกฉิน หรือ เร่งด่วน

ก่อนดำเนินการให้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- 1) อาคาร สถานที่
- 2) บุคลากรทางการแพทย์ และ ทีมALS & BLS
- 3) การเตรียมอุปกรณ์ และ ระบบห่วงโซ่ ความเย็น (cold chain systems)
- 4) ข้อมูลผู้รับวัคซีน
- 5) เส้นทางรถส่งกลับ ไป โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด



อาคารสถานที่

- อาจเป็น วัด หรือ โรงเรียน หรือ อาคารที่ **สามารถเดินทางถึงโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ได้ภายในเวลาไม่เกินสิบนาที**
- มีพื้นที่เพียงพอ ในทุกจุดบริการ โดยยึดหลักการป้องกันการติดเชื้อ เช่น อากาศโปร่ง ไม่ร้อนเกินไป มีห้องน้ำ จุดล้างมือ จุดพักคอย จุดสังเกตและเตียงพัก เพียงพอตามจำนวนผู้มารับวัคซีน เพื่อสามารถจัดสถานที่จุดปฏิบัติงาน
- มี internet /wi-fi เพื่อลง ระบบ ข้อมูล
- เส้นทางเข้าออก สะดวก หากเกิดกรณีฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือได้ทันเวลา



บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข

- 1) แพทย์
- 2) พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ ประจำทุกจุด พร้อมชุด PPEพิจารณา ตามความเสี่ยง และ สถานการณ์
- 3) ทีม ALS & BLS อย่างละ 1 ทีม พร้อม อุปกรณ์ กู้ชีพและรถพยาบาล ที่สามารถ นำส่ง โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ภายใน ๑๐ นาที
- 4) ผู้ประสานงานหลักในพื้นที่ และ ผู้ดูแลความเรียบร้อย ของสถานที่
 - ทั้งนี้ จำนวน บุคลากรขึ้นกับ สถานที่และจำนวน ผู้มารับวัคซีน

ผู้มารับวัคซีน

- ควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว หรือ โรคเรื้อรังอื่นๆ
อายุน้อยกว่า 60 ปี
- สำหรับกลุ่มที่มีโรคประจำตัว และ อายุมากกว่า 60 ปี ควรฉีดที่รพ
ที่รับยาปกติ
- ควรลงทะเบียน ล่วงหน้า สามารถนัดช่วงเวลาในการรับวัคซีน

ขั้นตอนการรับวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล

จุดที่ 1 ลงทะเบียน
วัคซีน ทำบัตร กรอก
เอกสาร ประเมินตนเอง

จุดที่ 2 ชักประวัติ
วัดสัญญาณชีพ และ
ประเมินความเสี่ยง

จุดที่ 3
รอฉีดวัคซีน
สแกนไลน์ หมอพร้อม

จุดที่ 6
ตรวจร่างกาย
ก่อนกลับบ้าน

จุดที่ 5

- พักสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที
- ทำความเข้าใจการใช้ไลน์ หมอพร้อม
- ทีม ALS & BLS stand by

จุดที่ 4
ฉีดวัคซีน

คำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

จุดที่ 1 วัคซีน ทำบัตร พร้อมกรอกเอกสาร checklist เพื่อประเมินตนเอง เกี่ยวกับประวัติเสี่ยง

จุดที่ 2 การซักประวัติ วัคซีนชัฟ และ ประเมินความเสี่ยง หาก มีประวัติกลุ่มโรคเสี่ยง และ ประวัติภูมิแพ้ ควรแนะนำให้รับวัคซีน แจ้ง จนท หาก มีอาการผิดปกติ หลังฉีดวัคซีน ทั้งนี้ และ แม้จะครบ ช่วงสังเกตอาการให้แจ้งหมายเลขด่วนของ รพ เพื่อรับการช่วยเหลือ อย่างทันเวลา

จุดที่ 3 รอฉีดวัคซีน จนท แนะนำ สแกนไลน์ หมอพร้อม

จุดที่ 4 ฉีดวัคซีน ณ จุดนี้ควรมี อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือ อุปกรณ์กู้ชีพ เตรียมพร้อม

จุดที่ 5 ระหว่างสังเกตอาการ ณ จุดนี้ ควรมี จนท กู้ชีพพร้อม อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือ อุปกรณ์กู้ชีพ เตรียมพร้อมตลอดเวลา และพร้อมเคลื่อนย้าย หาก จำเป็นและเส้นทางส่งกลับไป ยังรพ ที่ใกล้ที่สุด หาก เกิด อาการแพ้ แบบ anaphylaxis

จุดที่ 6 ตรวจร่างกายก่อนกลับบ้าน พร้อมเอกสารคำแนะนำ และเบอร์โทรติดต่อ แจ้ง จนท หาก มี อาการผิดปกติ





คำแนะนำสำหรับผู้รับวัคซีน ในการสังเกตอาการตนเอง ระหว่างนั่งรอ หลังฉีดวัคซีน

- ผู้รับวัคซีน หากมีอาการผิดปกติ ดังต่อไปนี้ ให้รีบแจ้ง จนท.ทันที
- อาการ หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจมีเสียง
- หน้าตาบวม หรือ ปากบวม หรือ ลิ้นบวม หรือ เสียงแหบ
- มีผื่นขึ้นตามตัว
- เวียนศีรษะ หรือ มีอาการหน้ามืดวูบ
- หรือ อาการผิดปกติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น หลังฉีดวัคซีน



คำแนะนำในการดูแลรักษาเบื้องต้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หากสงสัยมีอาการแบบรุนแรง (Anaphylaxis) นอกสถานพยาบาล

- ประเมินอาการเบื้องต้น ตรวจร่างกาย
- monitor vital sign & Oxygen Sat
- เริ่มจากการให้ **Adrenaline 1:1,000 ขนาด 0.3 ml intramuscular injection** และ รับประทาน ที่ใกล้ที่สุด
- ถ้ามีอาการรุนแรงสามารถให้ซ้ำได้ อีก 1-2 ครั้ง ในระยะเวลา 5 -15 นาที



การจัดบริการให้วัคซีน โควิด -19 นอกสถานพยาบาล

- 1) อาคาร สถานที่
- 2) บุคลากรทางการแพทย์ และ ทีมALS & BLS
- 3) การเตรียมอุปกรณ์ และ ระบบห่วงโซ่ ความเย็น (cold chain systems)
- 4) ข้อมูลผู้รับวัคซีน
- 5) เส้นทางส่งกลับ ไป โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด



THANK YOU