

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย
(เพิ่มเติม ณ เดือนพฤศจิกายน 2564)

กรมควบคุมโรค
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564























แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

สูตรที่มีการรับรองและเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ

<p>การฉีดวัคซีน สูตรไขว้</p>	   <p>ระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์</p>	 
<p>การฉีดวัคซีน สูตรไขว้</p>	   <p>ระยะห่างระหว่างเข็ม 4-12 สัปดาห์</p>	 
<p>การฉีดวัคซีน ชนิดเดียวกัน</p>	   <p>ระยะห่างระหว่างเข็ม 8-12 สัปดาห์</p>	 
<p>การฉีดวัคซีน ชนิดเดียวกัน</p>	   <p>ระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์</p>	 



กรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ดังนี้



- ✓ พิจารณาให้ใช้สูตรไขว้ Sinovac – AstraZeneca เป็นอันดับแรก โดยเร่งรัดการใช้วัคซีน Sinovac ที่คงเหลือในพื้นที่สำหรับประชากรไทยและประชากรต่างด้าว
- ✓ ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำกับติดตามการฉีดวัคซีนในประชากรต่างด้าว และจัดช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชากรต่างด้าว ทั้งผู้ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และรอการขึ้นทะเบียน กรณีที่วัคซีน Sinovac ไม่เพียงพอ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนเพิ่มเติมมาได้ที่กรมควบคุมโรค
- ✓ วัคซีน AstraZeneca ที่จัดสรรในเดือน ตุลาคม 2564ให้นำมาฉีดเป็นเข็มที่ 2 ของสูตร Sinovac - AstraZeneca หรือสูตร AstraZeneca – AstraZeneca เป็นอันดับแรก หากมีวัคซีนคงเหลือสามารถนำไปฉีดเป็นเข็มกระตุ้น (Booster dose) ได้



กรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ดังนี้



- ✓ การจัดสรรวัคซีน AstraZeneca ในเดือน พฤศจิกายน 2564 จะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการพร้อมระบุจำนวนวัคซีนที่จะให้เป็นเข็มที่ 1 ของสูตร AstraZeneca – Pfizer และเข็มที่ 2 ของสูตร Sinovac – AstraZeneca หรือสูตร AstraZeneca – AstraZeneca กรณีมีวัคซีน AstraZeneca คงเหลือจากการฉีดเป็นเข็มกระตุ้น สามารถนำมาฉีดเป็นเข็มที่ 1 สูตร AstraZeneca-Pfizer ได้
- ✓ การบริหารจัดการวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับสูตร AstraZeneca – Pfizer มีดังนี้
 - ในพื้นที่ 76 จังหวัด กรมควบคุมโรคจะจัดสรรวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ตามจำนวนวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ที่แสดงในระบบข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข MOPH IC
 - ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้ใช้วัคซีน AstraZeneca และ Pfizer ที่คงคลัง ทั้งหมด
- ✓ ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำกับการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำกับและตรวจสอบจำนวนวัคซีนคงคลังในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนั้นๆ เพื่อป้องกันมิให้สูญเสียวัดขึ้นเนื่องจากวัคซีนหมดอายุ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

1. เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในเดือนพฤศจิกายน 2564

2. มอบหมาย

- กรมควบคุมโรค ดำเนินตามแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19

- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

เร่งรัดการจัดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

กำกับและตรวจสอบสถานะวัคซีนคงคลัง